

ENERGEN	NÖVÉNY	AZ ALKALMAZÁS IDEJE ÉS FÁZISA	AZ ÁLLOMÁNY SÜRÜSÉGE	AZ ÁLLOMÁNY ÁLLAPOTA	ENERGEN KÉSZÍTMÉNY	ADAG	HATÁSOK ÉS A TERMÉSKÉPZŐDÉSHEZ VALÓ VISZONYUK
	ŐSZI REPECE (érvényes a környéris és az ősi mélyre selye ritka állomány 35 növényt jelent m ² -enként)	ŐSZI ALKALMAZÁS AUGUSZTUSTÓL AZ ŐSZI VEGETÁCIÓS IDŐSZAK ALATT. OPTIMÁLISAN MIN. 4. LÉVEL A NÖVÉNYEN. TAVASZI REGENERÁCIÓ A TÉL UTÁN, A LEVÉLRŐZSÁK ÚJULATÁIG HOSSZABBÍTÓ NÖVEKEDÉS VIRÁGZÁS ELŐTT-TŐL A BECŐTERMÉSEK NÖVEKEDÉSÉNEK ELSŐ FELÉIG	MINDEN ÁLLOMÁNY - UNIVERZÁLIS ALKALMAZÁS RITKA SÜRŰ	MINDEN ÁLLOMÁNY GYENGÉTŐL KÖZÉPSIG ERŐS	FULHUM PLUS Mo FULHUM PLUS Mo	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,7 l/ha 0,5 l/ha	Gyökérfázódás, a gyökérmak erősítése, oldalsó gyökér indukciója, nagybajó fagyálló képesség = jobb átélés, több virág a növényen. Nagyobb N-felvétel. STABIL TERMÉSKÉPZŐDÉSSEL, BÍRÓ TERÜLETEN KÖZELI FÉRTÉKRE KERÜL. A KORAI VETÉS NEM HALADJA MEG A VETÉSI EGYSÉGET 0,7-ET, ÉS SZÉLES 60 KG N/HA-T ADNIK, BEFÉRTETNEK AZ IDŐBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSSAL ÉS STIMULÁCIÓVAL !!! Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagyobb mértékű növekedése = az állomány fennmaradása száraz időszakokban és növekedéstimuláló normál csapadékmennyiség esetén, az ezermagtömeg növekedése. Nagyobb N-felvétel. Gyökérfázódás, az állomány jelentős erősödése, a szárazságtűrő képesség nagyobb mértékű növekedése, az ezermagtömeg növekedése - a tápanyagok generatív szervekbe történő áramlásának segítségével, az ültetvény erősödése. Nagyobb N-felvétel a fő növekedési időszakban. EZT AZ ALKALMAZÁST EREDETTILEG NEM JAVASOLJUK, DE A FARKONK KIVÁLT HATÁSSAL VAN. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése, az asszimilátumok virágokba és becértmésekbe való áramlásának segítése = az ezermagtömeg növekedése normál csapadék esetén és az ezermagtömeg megőrzése száraz időszakokban.
	ŐSZI GABONAFÉLÉK (Ősi búza, árpa és tritikálé ősi kezelése) ŐSZI ÉS TAVASZI GABONAFÉLÉK (a tavaszi kezelés érvényes a tavaszi búzára, zabra és a tavaszi tritikálékezelésre is)	ADALÉK A CSÁVÁZÓZERHEZ (ES TRÁGYA GERMIN) ŐSZI ALKALMAZÁS 3 LÉVELTŐL OPTIMÁLISAN AZ 1. HATÁRS KIALAKULÁSÁNAK KEZDETÉTŐL REGENERÁCIÓ A TÉL UTÁN, BOKROSODÁS - ŐSZEK BBCH 25 A BOKROSODÁS VÉGE - ŐSZI ÉS TAVASZI GABONAFÉLÉK BBCH 29 - BBCH 31 BBCH 37 FÁZIS, IDŐPONT ÉS FÁZIS A NÖVÉNYEK EGYHANGYAN TÖRTÉNŐ RÖVIDÍTÉSÉTŐL A TEJES ÉRÉS KEZDETÉIG	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY, AHOOL NINCIS HATÁRSFELÉLEG	MINDEN ÁLLOMÁNY HATÁRSFELÉLEGEL BÍRÓ ÁLLOMÁNYOK, OLVAN TERSÉGEK, AHOOL AZ ÁLLOMÁNY NEM SZERVED TAVASZI SZÁRAZSÁGTÓL HATÁRSFELÉLEGEL ÁLLOMÁNYOK, OLVAN TERSÉGEK, AHOOL AZ ÁLLOMÁNY SZÁRAZSÁGTÓL SZERVED	ENERGEN GERMIN PH FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS FULHUM PLUS Mo	0,7-1 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha	A vetőmagra történő alkalmazás az állomány gyors, dinamikus, kiegyensúlyozott keletét biztosítja - előny az alacsony hektáronkénti ár. Gyökér- és hajszálgyökér-képződés segítése, az állomány erősödése, nagyobb N-felvétel = jobb átélés, az állomány erősödése. A bokrosodás segítése. Nagyobb N-felvétel. A GERMIN olyan anyagot tartalmaz, amely csírázókor felgyorsítja a keményítőket egyszerű cukrok bomlását. Gyorsan felszabadul az energia. A következőkben dinamikus kelet és kiegyensúlyozott állomány. TAVASZI SZÁRÁZ IDŐSZAKOKKAL BÍRÓ TERÜLETEKEN SEGÍTI A TERMÉSKÉPZŐDÉST AZ ŐSZI HATÁRSFELÉLEGEL. A legyengőbb hatások elnyomása és a fő hatások kiegyensúlyozása. Ezzel elérhető a termék kockázata, hogy a kálciust nem hajtó hatások feleslegesen elhasználnak 20-40 kg N-t hektáronként. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. Mindens hajtás megerősítése és kiegyensúlyozása. A központi hajtások felhúzása és megerősítése. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. 0,7 l/ha adagot - a túlbokrosodott, parasztiak, kalász nélküli hajtásokkal bíró állományokhoz. 0,5 l/ha univerzális adag az egyéb állományokhoz. AZ ALKALMAZÁS HATÁSA NAGYON ERŐS. MIDŐN NÖVEKEDÉST, AZ ALKALMAZÁS AZ EZERMAGTÖMEGET 0,8 G/G NÖVEKEDÉSE ESETÉN TERÜL MEG. AZ ALKALMAZÁS NEM KOCKÁZTOS, MIVEL A CLEANSTORM JELENTŐS HATÁSSAL BÍR SZÁRAZSÁG ELLÉN.
	TAVASZI SÓRÁRPA	A SZÁRBAINDULÁS KEZDETÉTŐL AZ ÚTOLSO GOMBÓLÓ SZER ALKALMAZÁSÁNAK IDEJÉIG	MINDEN ÁLLOMÁNY SZÁRÁZ IDŐSZAKOKBAN		CLEANSTORM B	0,2 l/ha 0,6 l/ha-ig	A N-felvétel növekedése felerősíti a minőségi trágyázás hatását az étezési minőségben. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése. Az egészségi állapot javulása. ÚJONNAN JAVULNI A TELJES TAVASZI VEGETÁCIÓS IDŐSZAKBAN IS 3-4-SZER ISMÉTELVE 0,15 l/ha ADAGOT. A HATÁSOK A SZÁRÁZ IDŐSZAKOKBAN KIFEJEZETTEN POZITÍV VOLTAK !!! A vetőmagra történő alkalmazás az állomány gyors, dinamikus, kiegyensúlyozott keletét biztosítja - előny a levele történő elmozdításra képest alacsony ár. Gyökérfázódás segítése, az állomány erősödése, a bokrosodás segítése. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hajtások megtartása szárazság esetén = jobb víz- és tápanyaggyógyakódás, erősebb állomány, az ezermagtömeg és a kálciust levő magok számának enyhé növekedése. Nagyobb N-felvétel. A legyengőbb hatások elnyomása és a fő hatások kiegyensúlyozása. Ezzel elérhető a termék kockázata, hogy a kálciust nem hajtó hatások feleslegesen elhasználnak 20-40 kg N-t hektáronként. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. Mindens hajtás megerősítése és kiegyensúlyozása. A központi hajtások felhúzása és megerősítése. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése, az asszimilátumok magokba történő áramlásának segítése = az ezermagtömeg megőrzése száraz időszakokban és az ezermagtömeg növekedése normál csapadék esetén. Ezután a mag N-tartalmának csökkentéséhez.
	MUSTÁR, MÁK	LEVÉLRŐZSA - 5. LÉVELTŐL A HOSSZABBÍTÓ NÖVEKEDÉS KEZDETÉIG A HOSSZABBÍTÓ NÖVEKEDÉSTŐL A BÍMBOZÁSIG A BÍMBOZÁSTÓL A BECŐTERMÉSIG	RITKA SÜRŰ	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY	FULHUM PLUS Mo FULHUM PLUS Mo	0,5 l/ha 0,7 l/ha	Gyökérfázódás, a növekedés felkésztése, oldalsó ágak növekedése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése = a virágok számának növekedése a növényen, az állomány erősödése. Nagyobb N-felvétel. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagyobb mértékű növekedése = az állomány fennmaradása száraz időszakokban és növekedésserkentés normál csapadékmennyiség esetén. Az ezermagtömeg növekedése feltételeknek megfelelően. Nagyobb N-felvétel. Gyökérfázódás, a növény erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagyobb mértékű növekedése = az állomány megerősítése, az ezermagtömeg megtartása száraz időszakok körülményei között, és növekedés megfelelő nedvesség esetén. Az egészségi állapot javulása. Nagyobb N-felvétel. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése, az asszimilátumok magokba történő áramlásának segítése = az ezermagtömeg megőrzése száraz időszakokban és az ezermagtömeg növekedése normál csapadék esetén.
	NAPRAFORGÓ KUKORICA	3 - 10. LÉVEL 8 - 12. LÉVEL A 6. LÉVELBEN (HA CSAK 1 ALKALMAZÁS LESZ)	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY EGYSZERŐSÍTETT INTENZÍV VÁLTOZAT		FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS FRUKTUS PLUS Mo	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha	A növekedés erősödése, hosszú távú szárazság elleni védelem, az ezermagtömeg növekedése. Gyökérfázódás, a növény erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagy mértékű növekedése = az állomány fennmaradása száraz időszakokban és növekedésserkentés normál csapadékmennyiség esetén. Az ezermagtömeg növekedése feltételeknek megfelelően. Nagyobb N-felvétel. A növekedés erősödése, hosszú távú szárazság elleni védelem, az ezermagtömeg növekedése. Gyökérfázódás, a növény erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagy mértékű növekedése = az állomány fennmaradása száraz időszakokban és növekedésserkentés normál csapadékmennyiség esetén. Az ezermagtömeg növekedése feltételeknek megfelelően. Nagyobb N-felvétel.
	BURGONYA (vetőburgonya) BURGONYA (keményfűző) BURGONYA (fogyasztható)	A KIKELÉSTŐL A BBCH 40 FÁZISIG. OPTIMUM BBCH 20 A GUMÓKÉPZŐDÉS KEZDETÉTŐL - A BBCH 40 FÁZISIG. A FULHUM ÉS CLEANSTORM 2 EGYMÁST KÖVETŐ ALKALMAZÁSA A FENT MEGADOTT IDŐPONTOKBAN	GYENGÉTŐL KÖZÉPSIG ERŐS GYENGÉTŐL KÖZÉPSIG ERŐS GYENGÉTŐL KÖZÉPSIG ERŐS		FULHUM PLUS Mo CLEANSTORM B 1. FULHUM PLUS Mo 2. CLEANSTORM B	0,5 l/ha 0,3 l/ha 0,5 l/ha 0,3 l/ha	Gyökérfázódás, az indonővekedés segítése = a közepes és kisebb gumók mennyiségének növekedése a növényen. Nagyobb N-felvétel. A koronfoll-koncentráció növekedése, levelek növekedése, az idősebb levelek előregedésének lassítása = az állomány erősödése, a keményfűzőtartalom növekedése. Az egészségi állapot javulása. Nagyobb N-felvétel. Hatók: Id. az alkalmazást fent = a növényen levő gumók mennyiségének növekedése, kombinálva a gumók méretének növekedésével, továbbá a közepes méretű gumók arányának növekedése. Nagyobb N-felvétel.
ENERGEN	NÖVÉNY	AZ ALKALMAZÁS IDEJE ÉS FÁZISA	AZ ÁLLOMÁNY SÜRÜSÉGE	AZ ÁLLOMÁNY ÁLLAPOTA	ENERGEN KÉSZÍTMÉNY	ADAG	HATÁSOK ÉS A TERMÉSKÉPZŐDÉSHEZ VALÓ VISZONYUK
	CUKORRÉPA (használatos sárgarépához és fehérreépához is)	KELO NÖVÉNYEK 3 - 6. LÉVEL KÖZÖTT 6. LÉVELTŐL JÚLIUS 20-IG A GUMÓKÉPZŐDÉS KEZDETÉTŐL - A BBCH 40 FÁZISIG. NYÁRI ALKALMAZÁS - 07.01-IG 09.15-IG.	RITKA ELEGENDŐ CSAPADÉK CSAPADÉK ELÉGTELENSÉGE VAGY HIÁNYA MINDEN ÁLLOMÁNY - UNIVERZÁLISAN	GYENGÉBB CLEANSTORM B CLEANSTORM B	FULHUM PLUS Mo CLEANSTORM B CLEANSTORM B	0,5 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha 0,5 l/ha	Az elvett és rosszul kieltő állomány erősödése és kiegyensúlyozása használatos. Nagyobb N-felvétel. A koronfoll-koncentráció növekedése, levelek növekedése, az idősebb levelek előregedésének lassítása = az állomány erősödése, a keményfűzőtartalom növekedése. Az egészségi állapot javulása. Nagyobb N-felvétel. A vetőmagra történő alkalmazás az állomány gyors, dinamikus, kiegyensúlyozott keletét biztosítja - előny a levele történő elmozdításra képest alacsony ár. Gyökérfázódás segítése, az állomány erősödése, a bokrosodás segítése. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hajtások megtartása szárazság esetén = jobb víz- és tápanyaggyógyakódás, erősebb állomány, az ezermagtömeg és a kálciust levő magok számának enyhé növekedése. Nagyobb N-felvétel. A legyengőbb hatások elnyomása és a fő hatások kiegyensúlyozása. Ezzel elérhető a termék kockázata, hogy a kálciust nem hajtó hatások feleslegesen elhasználnak 20-40 kg N-t hektáronként. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. Mindens hajtás megerősítése és kiegyensúlyozása. A központi hajtások felhúzása és megerősítése. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség növekedése. Nagyobb N-felvétel. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése, az asszimilátumok magokba történő áramlásának segítése = az ezermagtömeg megőrzése száraz időszakokban és az ezermagtömeg növekedése normál csapadék esetén.
	SZŐLŐ (cukor- és vörösbujdos - a termelési minőség és erősen rövid fajták)	FIATAL NÖVEKEDŐ HATÁSOKRA ELVIRÁGZÁS UTÁN AUGUSZTUS 20-IG	MINDEN ÁLLOMÁNY		CLEANSTORM B	0,5 l/ha	A növekedés erősödése, hosszú távú szárazság elleni védelem, az ezermagtömeg növekedése. Az egészségi állapot javulása. Az asszimilátumok boglyokba történő áramlásának növekedése, a cukrok és savak bioszintézisének közvetlen befolyásolása, az egészségi állapot jelentős javulása = a cukortartalom és a kóvatartalom a termőszózon enyhé növekedése mellett. Nagyfokú szárazság elleni védelem.
	SZŐLŐ (cukor- és vörösbujdos - a termelési minőség és erősen rövid fajták)	FIATAL NÖVEKEDŐ HATÁSOKRA ELVIRÁGZÁS UTÁN 10-15 NAPPA A 2. ALKALMAZÁS UTÁN FIATAL, NÖVEKEDŐ TERMÉSEKRE	MINDEN ÁLLOMÁNY (az állományoknak jó minőségű NPK-ra és mikroelemes tápanyagra van szükségük - különben a stimuláló tápanyaghiány és a hozamcsökkenés okozhat.)		FULHUM PLUS Mo 2x FRUKTUS PLUS	0,5 l/ha 0,5 l/ha	Gyökérfázódás, a növekedés megerősítése, a cukrok és savak bioszintézisének közvetlen befolyásolása, az egészségi állapot jelentős javulása. Az asszimilátumok boglyokba történő áramlásának növekedése, a cukrok és savak bioszintézisének közvetlen befolyásolása, az egészségi állapot jelentős javulása = a cukortartalom és a kóvatartalom a termőszózon enyhé növekedése mellett. Nagyfokú szárazság elleni védelem.
	SZŐLŐ (univerzális javítás)	A TELJES VEGETÁCIÓS IDŐSZAKBAN A LEVÉLFELLETRE	MINDEN ÁLLOMÁNY, AZ EGÉRSÉGI ÁLLAPOT, A TERMÉSHOZAM ÉS A CUKOR- ÉS KIVONATKÉPZÉS		CLEANSTORM B	0,6 l/ha	Az állomány erősödése, a gyökérfázódás elősegítése, az alsó ágak magabiztos kerülése. Nagyobb N-felvétel. A teljes vegetációs időszakban javasoljuk az ENERGEN CLEANSTORM NEDVÉSTŐZSERT, AMELY JAVÍTJA A SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESÉGET, NÖVELI A CUKOR BIOSZINTÉZIST ÉS JELENTŐSEN JAVÍTJA A GOMBÁS FERTŐZÉSEKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓKÉPESÉGET. Az egészségi állapot javulása.
	BORSÓ, SZÓJA	FIATAL NÖVÉNYEK 7. LÉVELIG A FŐ NÖVEKEDÉSI IDŐSZAK KEZDETE A VIRÁGZÁS KEZDETÉTŐL A NŐVÉLYKÉPZŐDÉSIG	MINDEN ÁLLOMÁNY GYENGÉTŐL KÖZÉPSIG ERŐS MINDEN ÁLLOMÁNY		CLEANSTORM B CLEANSTORM B	0,5 l/ha 0,6 l/ha 0,4 l/ha	Az állomány erősödése, a gyökérfázódás elősegítése, az alsó ágak magabiztos kerülése. Nagyobb N-felvétel. Gyökérfázódás, az állomány erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség nagyobb mértékű növekedése = az állomány megerősítése, az ezermagtömeg megtartása száraz időszakok körülményei között, és növekedés megfelelő nedvesség esetén. Nagyobb N-felvétel. KISSE NÖVELI A CSÍCSOMPAKATZT, AZ ÁGAK ALSÓ SZINTJE FELJEBB TOLÓDOK, A KOMBÁJN MEGTARTÁSRA KÉPES. A szárazságtűrő képesség nagyfokú növekedése, az asszimilátumok magokba történő áramlásának segítése = az ezermagtömeg megőrzése száraz időszakokban és az ezermagtömeg növekedése normál csapadék esetén.
	GYÜMÖLCSŐSÖK	ELVIRÁGZÁS UTÁN - FIATAL NÖVÉNYŐ ÁGAK 2 - 3 HÉTTEL AZ 1. LAKLAMAZÁS UTÁN 2 - 3 HÉTTEL A 2. ALKALMAZÁS UTÁN	MINDEN GYÜMÖLCSŐS MINDEN GYÜMÖLCSŐS MINDEN GYÜMÖLCSŐS		FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS CLEANSTORM B	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,3-0,5 l/ha	A növekedés erősödése, hosszú távú szárazság elleni védelem, az ezermagtömeg növekedése. Az egészségi állapot javulása. Az asszimilátumok gyümölcsökbe történő áramlásának növekedése, a cukrok és savak bioszintézisének közvetlen befolyásolása, az egészségi állapot jelentős javulása = a cukortartalom növekedése és nagyobb gyümölcsök elérése. A teljes vegetációs időszakban javasoljuk az ENERGEN CLEANSTORM NEDVÉSTŐZSERT, AMELY JAVÍTJA A SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESÉGET, NÖVELI A CUKOR BIOSZINTÉZIST ÉS JELENTŐSEN JAVÍTJA A GOMBÁS FERTŐZÉSEKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓKÉPESÉGET.
	EPER (javított készítménykombináció)	TAVASZI REGENERÁCIÓ A TÉL UTÁN VIRÁGZÁS ELŐTT A LEVÉLYFÁZISÁVAL (optimális időpont a zárt bimbók) 07.10-TŐL 09.10-IG A PK-TRÁGYÁVAL EGYÜTT	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY		FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS FULHUM PLUS Mo	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha	Hajszálgyökerek képződése, a növények tápanyagfelvételének növekedése, az állomány erősödése = a magas termésképződés előfeltételeinek kialakítása. Az asszimilátumok termékekbe történő áramlásának növekedése, a cukrok és savak bioszintézisének közvetlen befolyásolása, az egészségi állapot javulása = a cukortartalom növekedése és nagyobb intenzitású napgyűlés mellett. Gyökérfázódás, az állomány regenerálódása aradás után, virágbimbók indukciója a következő évre, hideg- és szárazságtűrő képesség javulása = a virágok számának növekedése a növényen, a növény erősödése. A teljes vegetációs időszakban javasoljuk az ENERGEN CLEANSTORM NEDVÉSTŐZSERT, AMELY JAVÍTJA A SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESÉGET, NÖVELI A CUKOR BIOSZINTÉZIST, AZ AROMÁT ÉS A GOMBÁS FERTŐZÉSEKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓKÉPESÉGET.
	ZÖLDSÉG (fatai növények) ZÖLDSÉG (káposztafélék) ZÖLDSÉG (hagymafélék)	FIATAL NÖVÉNYEK LEGFELJEBB 10. LÉVELLEL, VAGY VIRÁGZÁS ELŐTT A TERMÉSKÉRTI TERMESZTETT ZÖLDSÉGEKRE A FŐ NÖVEKEDÉSI IDŐSZAK 4. LÉVELTŐL 2 - 3 ALKALMAZÁS ISMÉTELVE 15 NAP UTÁN	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY		FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS	0,5 l/ha 0,5 l/ha	Gyökérfázódás, a növény erősödése, a hideg- és szárazságtűrő képesség javítása = a magasabb termésképződés előfeltételeinek kialakítása. Nagyobb N-felvétel. A gyökérfázódás elősegítése és növekedésserkentése, a szárazságtűrő képesség javítása, az eljáratlan növekedése.
	ZÖLDSÉG (ismételt gyökérfázódás és levelezés) ZÖLDSÉG (ismételt gyökérfázódás és levelezés)	GYÖKÉRFÁZÓDÁSOK FŐ NÖVEKEDÉSI IDŐSZAKA SZEDÉS UTÁN REGENERÁCIÓ ISMÉTELT LEVÉLSZEDÉS ELŐTT LEVÉLZÖLDSÉGEKRE	MINDEN ÁLLOMÁNY		CLEANSTORM B	0,5 l/ha	A koronfoll-koncentráció növekedése, levelek növekedése, az idősebb levelek előregedésének lassítása = a biomassza hozamnövekedése, a szárazságtűrő-tartalom növekedése. Nagyobb N-felvétel.
	MINDEN ZÖLDSÉG	A TELJES VEGETÁCIÓS IDŐSZAKBAN A LEVÉLFELLETRE	MINDEN ÁLLOMÁNY AZ EGÉRSÉGI ÁLLAPOT, A TERMÉSHOZAM ÉS A CUKOR- ÉS KIVONATKÉPZÉS		FULHUM PLUS Mo	0,5 l/ha	A teljes vegetációs időszakban javasoljuk az ENERGEN CLEANSTORM NEDVÉSTŐZSERT, AMELY JAVÍTJA A SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESÉGET, NÖVELI A CUKOR BIOSZINTÉZIST, AZ AROMÁT ÉS A GOMBÁS FERTŐZÉSEKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓKÉPESÉGET.
	HÁZILEN OLAJLEN MINDKÉT LENTIPUS	FÁCSKA FÁZISTÓL (3-12 CM MÉRET) A GYORS NÖVEKEDÉSI IDŐSZAK ALATT A KELES UTÁNI 40. NAPIG FÁCSKA FÁZISTÓL (3-12 CM MÉRET) A GYORS NÖVEKEDÉSI IDŐSZAK ALATT A KELES UTÁNI 40. NAPIG A GYORS NÖVEKEDÉSI IDŐSZAK ALATT A KELES UTÁNI 40. NAPIG	MINDEN ÁLLOMÁNY MINDEN ÁLLOMÁNY SZÁRÁZ HELYEK		FULHUM PLUS Mo FULHUM PLUS Mo FRUKTUS PLUS	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha	Hajszálgyökerek kialakulása, a növények tápanyagfelvételének növekedése, az állomány erősödése = a hosszabbított növekedés segítése, a rost tartalmának növekedése. Nagyobb N-felvétel. Hajszálgyökerek kialakulása, oldalságok indukciója, az állomány erősödése = több virág a növényen és az eljáratlan növekedése. Nagyobb N-felvétel. A szárazságtűrő képesség növekedése, növekedésserkentés, az állomány erősödése normál csapadékmennyiség esetén = az állomány megtartása száraz időszakokban, a megdőléssel szembeni ellenállóképesség növekedése.

TALMAZZA AZ EGYES NÖVÉNYEKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI ELMÉLTILEG LEHETÉSGES ALKALMAZÁST. A TERMESZTŐNEK KELL KIVÁLASZTANIA AZ ÁLLOMÁNY AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁNAK ÉS A SAJÁT CELJAINAK LEGINKÁB MEGFE